

四庫全書

子部

# 欽定四庫全書

子部  
普濟方卷三十九

詳校官太醫院恩糧臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣李 蔡

騰錄監生臣吉世琛

欽定四庫全書

普濟方卷三十九

明

周王朱橚 撰

大臟腑門

大小便不通

論

夫脾胃大小腸膀胱者倉廩之本營之居也名曰氣能  
化糟粕轉味而出入者也蓋營受水穀之真精榮衛之  
根源大小腸膀胱得以變化皆營為之本是以小腸為  
受盛之官水穀初未分也及其化物歸於膀胱而為溺

轉於大腸而為糟粕必曰氣化則能出矣或陰陽之氣不平寒熱相勝或氣實塞而不通或氣虛損而為洩或燥而急或熱而祕皆陰陽不和之病也治此不緊以寒熱為法寒劑蕩滌熱劑乾燥反傷和氣耗其津液若關格不通三焦約病專以榮衛之否塞乳後便難與夫老者祕澀之病又以津液不足止可滑以利之潤以滋之苟蕩以駛劑則糟粕不通真氣受弊不可不知也○關格大便不通謂之內關小便不通謂之外格二便俱

不通為關格也由陰陽氣不和榮衛不通故也陰氣太盛陽氣不得營之曰內關陽氣太盛陰氣不得營之曰外格陰陽俱盛不得相營曰關格關格則陰陽之氣痞結腹內腹滿氣不行於大小腸故關格而大小便不通也又風邪在三焦三焦約者則小腸痛內閉大小便不通曰不得前後而手足寒者為三陰俱逆三日死也診其脉來浮牢且滑直者不得大小便也○大小便難者由冷熱不調大小腸有遊氣在於腸間搏於糟粕小便

不得氣流故大小便難也診其尺脉滑而浮大此為陽干於陰其人苦小腹痛滿不能尿尿即陰中痛大便亦然也

方

茱萸湯

出千金方

治腹脇脹滿關格大小便不通

吳茱萸

湯浸洗去涎曝乾微炒

大黃

剉炒

當歸

切桂去粗

皮

赤芍

藥

甘草

炙剉

芍藥

各三兩

人參

細辛

去苗葉各四兩

桃白

皮

去粗皮一握

乾薑

一兩炮

雄黃

三分

真珠末

五錢黃同研

雄

右將十一味呖咀每服三錢水一盞煎七分去滓下  
雄黃真珠末一字酒半盞更煎三沸空心服之一方作九  
梧桐子大每服三十九生薑橘皮湯下無雄黃

木香散 治下焦熱大小便不通氣脹滿悶

木香

三分

黃芩

去黑心  
三分

木通

剉炒  
三分

陳橘皮

湯浸去白  
焙三分

冬葵子

研一兩

瞿麥穗

一兩

檳榔

五錢

赤茯苓

去黑皮  
五錢

茅

根

五錢

右呖咀每服五錢水一盞半煎八分去滓溫服

治大小便難腹肚脹滿短氣

荊芥

一兩

芎藭

一兩

蒲黃

一兩

當歸

剉炒一兩

桂心

一兩

麝香

三

枚

川大黃

二兩

甘草

五錢

桃仁

四十枚

湯浸去

皮尖雙仁麤炒

右為末煉蜜為丸梧桐子大每服三十九生薑蔥白

湯下不拘時

茯苓丸 治大小便不通

赤茯苓

去黑皮五兩

芍藥

五兩

當歸

切焙五兩

枳殼

去穰麤炒五兩

白

朮

五兩

人參

五兩

大麻仁

三兩

大黃

剉三兩



右為末煉蜜九梧桐子大每服十五丸至二十九空  
心煎茅根湯下

大黃湯 治中焦熱實閉塞關格不通吐逆喘急

大黃

剉炙炒  
五錢

前胡

去蘆頭  
五錢

半夏

湯浸七次  
炒五錢

人參

五錢

黃芩

去黑心  
五錢

赤茯苓

去黑心  
五錢

木香

五錢  
檳榔剉五錢

右咬咀每服五錢水一盞半生薑五片煎八分去滓

溫服

芍藥湯

治大小便難臍腹妨悶

赤芍藥

錢五

羌活

錢五

桂心

錢五

川大黃

劉炒

郁李仁

湯

浸

去皮炒

川芒硝

一兩

檳榔

一兩

大麻仁

二兩

右為末煉蜜為丸梧桐子大每服三十九空心服溫

水下

茯苓湯

一名大黃散

治大小便不通心腹滿悶不能可過

赤茯苓

三兩

桑根白皮

劉三

瞿麥穗

二兩

大黃

劉炒

榆

二兩

白皮

劉二

防葵

去蘆

麻子仁

研如膏

二兩

右吹咀每服五錢水一盞半煎一盞去滓入芒硝末

五分更煎二沸空心溫服日晚再服

牽牛子丸 治下焦結熱腸胃燥澀大小便不通

黑牽牛

淘洗令淨炒令氣透便取出攤令冷取末二兩

青橘皮

焙去白用一兩

桑

根白皮

剉炒一兩

芍藥

焙一兩

枯蘂根

一兩

木通

剉一兩

陳橘

皮

焙並白用一兩

右為末煉蜜杵和丸梧桐子大每服十九十五九加至二十九茶酒任下

白朮散 治大小便難腹脇脹滿氣急

白朮

一兩

牽牛子

炒一兩

木通

一兩

川大黃

劉炒一兩

檳榔

一兩

川朴硝

一兩

陳橘皮

五錢

錢去白焙

右吹咀每服四錢水一盞煎至六分去滓空心溫服

滑石湯

治大小便俱不通

滑石

一兩

茅根

三分

車前子

三分

天門冬

去心焙一兩

冬瓜

穠

一兩

葇荂子

浸去浮者煮令芽

出曝乾

微炒一兩

右吹咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓食前溫

服日三

治大小便氣壅不利脹滿關格不通

木通

劉一兩

川朴硝

一兩

郁李仁

湯浸去皮炒一兩

車前子

一兩

黃芩

五錢

瞿麥花

五錢

右吹咀每服四錢水一盞煎六分去滓溫服

大黃散 治關格不通妨悶大小便秘澀

大黃

劉二兩

桂

去粗皮三分

冬瓜子

炒一兩

滑石

研三兩

朴硝

生鐵銚子炒乾刮下紙裹於黃土內窖一宿取出研細三兩五錢

右先將前三味為散更與滑石朴硝同研勻細每服

二錢濃煎白茅根湯空心調服至晚再服

黃芩湯 治大小便不通

黃芩

去黑心  
二兩

赤芍藥

三兩

白茅根

三兩

大黃

生用  
三兩

瞿麥

穗

右咬咀每服五錢水一盞半煎一盞去滓入朴硝末  
五分更煎二沸空心溫服

甘遂散 治氣痞心腹脹喘促大小便不利

甘遂

煨

牽牛子

炒

續隨子

去殼

葶藶子

大戟

各等分

右為末每服五分濃煎燈心湯空心調下服利水為度

治大小便不通

大黃

煨

牛蒡子

炒

羌活

獨活

滑石

各等分

右為末用熱水調下空心服即便利

五宣散 治大小便不通行滯氣

瞿麥

木通

甘草

虎杖

滑石

各等分

右為咀咀每服二錢水一盞燈心數莖煎七分臨卧

服

車前子湯 治大小便俱不通

車前子

五兩  
生用

木通

剉四兩

黃芩

去黑心  
三兩

郁李仁

湯浸  
去皮

尖雙仁

三兩

右將前三味搗篩與郁李仁拌勻每服五錢水一盞  
半煎一盞去滓入朴硝末五分更煎二沸食前溫服

日三

榆白皮湯 治大小便俱不通



榆白皮

甘草

炙剉各一兩五錢

滑石

三桂去粗皮一兩

右吹咀每服四錢水一盞半煎一盞去滓食前服日三

木通湯 治大小便不通

木通

剉二兩

大黃

剉生用

滑石

麻子仁

一合研如膏

右吹咀與麻子仁拌勻每服五錢水一盞半煎一盞入芒硝末五分更煎二沸空心服之

治大小便不通腹脅堅脹蒸下部方

蓮葉

三七莖并用

皂角

一挺

生薑

一兩切

右以漿水一斗二升煮十餘沸并滓分兩度而旋旋盛入小口磁缸中坐缸上蒸冷即易之未通即傾藥於桶斛中添熱水坐蘸下部即通

大黃散

出肘後方

治風冷氣入小腸忽痛堅急如吹狀大

小便不通或小腸有氣結聚如升大腸起名為關格大小便不通

川大黃

剉炒

苦參

剉

貝齒

燒灰

滑石

各一兩

一

右為末每服二錢葵根湯下不計時候溫服一方無

大黃

掩臍方

一名葱豆湯  
出危氏方

治大小便不通

連根葱

二三莖

生薑

一塊帶土者

淡豆豉

一十粒

鹽

二匙

右同研爛捏作餅子烘熟掩臍中以帛紮定良久氣透自通不然再換一劑一方搗碎為末米湯下

治諸大小便不通

海金沙

芒硝

朴硝

麝香

各等分

右為末白湯調服大便不通者加巴豆一粒

黃連散 治大小便秘澀壅熱累効

黃連

二兩

川大黃

二兩好醋炒

黃芩

一兩

甘草

炙一兩

右為末每服二錢食後溫水調下

芒硝湯

出千金方

治關格不通脬腹妨悶大小便不通

芒硝

研二兩五錢

冬葵子

炒三合

滑石

碎三兩

右吹咀每服五錢水一盞半煎一盞去滓入芒硝末五分更煎二沸空心溫服一方無滑石

芫花丸 治大小便不利

芫花

炒

滑石

研各五錢

大黃

剉炒三分

右為末煉蜜九梧桐子大每服二十九葱湯下

治大便不通

滑石

二兩

葵子

一兩

榆白皮

一兩

右為散煮麻子汁一升半取二匕服二服即通

治大小便不通

乾薑 鹽 杏仁

右等分搗導之

治大小便關格不通腹腸喘急

出聖惠方

水銀

一分

膩粉

一分

滑石

一分

右為末研令水銀星盡每服蔥湯調下一錢

治大小便秘結

出經驗良方

水銀

豆大一塊研細

巴豆

二粒去殼膜

硫黃

三塊如豆大

右研為膏作一劑塗於臍內良久才通即便去藥

治大小便難腹中有燥糞寒熱煩迫氣短汗出腹脹

方見本門大便祕澀不通類滯藏湯門

治大小便難

出聖  
患方

木香

五錢

青黛

五錢

麻油

二合

右水一大盞同煎令水盡惟有油去滓分三二服

冬葵根汁方 治大小便不通

生冬葵根

洗淨二斤搗  
羅取汁三合

生薑

四兩搗羅  
取汁一合

右攪勻分作二服空心一服有頃再服盡即通一方

不用生薑

治大小便關格不通

出聖  
患方

胡椒

二十粒  
搗研

川朴硝

五錢

右水一大盞煎胡椒至六分去滓入硝更煎一兩沸

候溫服

又方

出聖  
惠方

膩粉

一錢  
生麻油  
合

右相和空心服之

治大小便闕格不通肚脹氣築心悶絕

出聖  
惠方

蜀葵花

一兩  
搗爛

麝香

五分  
研



右水一大盞煎至五分去滓服之無花即取根擘破用之

推車散

出本  
事方

治大小便祕經月欲死者

推車客

七箇

土狗

七箇

如男病  
身如女子病

推車客用  
土狗用

頭推車客用

土狗用

客用

身

右用新瓦上焙乾為末用虎目樹皮向南者濃煎汁調只一服愈

治卒關格大小便並不通支滿欲死二三日則殺人

出肘

後方

苦酒

硝等分

右和塗臍上乾即易

又方

出肘後方

甘遂

二銖

貝齒

二枚

右搗下以三合漿水盡服之須臾即通

紫金沙散

治大小便不通

用紫金沙不拘多少蜂房蒂七枚搗為末每服一錢

溫酒調下

土馬驢湯 治大小便不通

右用土驢馬不拘多少走水淘火上用新磚煨過為粗末每服二錢水一盞煎至七分溫服

猪脂酒方

出千金方

治大小便不通

用冬葵子微炒一兩搗篩用水二盞煎一盞去滓入人乳汁半合和勻空心服之

髮灰散

出肘後方

治大小便不通及便血

用亂髮一兩洗淨燒灰為末細研每服三錢溫水調食前日三以通利為度

冬葵子湯 治大小便不通

用冬葵子微炒一兩搗篩用水二盞煎一盞去滓入人乳半合和勻空腹服之

治卒大小便不通

出冢藏  
經驗方

用鹽以紙裹燒投水中服之一方以鹽實臍內即通又以和苦酒傳臍又以水三升煮鹽三合使沸適寒

溫竹筒灌下部

又方

用含硝石吐出水

治大小便關格閉塞

出聖惠方

用蔓菁子油一合空腹服之即通通後汗出勿恠

治大小便關格不通肚腹氣葉心閉絕

出聖惠方

用烏柏樹東面白皮陰乾為末如五七日不通熱水調下二錢如急用火上焙乾為妙

鐵腳丸

一名皂  
笑飲

治大小便關格不通經三五日者

出  
聖

惠  
方

用不蛀皂角燒灰研細粥飲調下三錢一方用皂角  
炙去皮子為末酒糊或煉蜜丸梧桐子大每服三十  
丸酒下溫水亦得一方皂角燒置桶內薰其後部即  
通

治大小便不通

出千  
金方

用葵子末一升青竹葉一把水二升煮五沸飲服

又方 出千金方

用榆白皮切一升葵子一升水五升煎取二升分三服

又方 出千金方

用甑帶煮取汁和蒲黃方寸匕日三服

治大小人小便不利腹大且堅 出經驗良方

用故衣多垢者切一升水三升煮取一升分三服

治老人虛大小便不通 一名琥珀散  
出經驗良方

用真琥珀研如粉人參湯調下亦治心痛老人虛大

便不通葱白三寸水煎熟不用葱入阿膠一片於葱湯內鎔開溫服吳內翰母曾服得效

治關格大小便不通脹滿欲死兩三日則殺人

出肘後方

用芒硝二兩紙裹三四重炭火燒之令內一升湯浸服當先飲湯一升已吐出乃服之

治卒關格大小便不通支滿欲死及旬日一月日不得

大便

出千金方

用葵子二升水四升煮一升服內猪脂如雞子大一丸



彌佳

貼臍膏

用甘遂為細末以生麵調為糊攤紙上糝末在上塗臍中及塗臍下便處另煎甘草水溫涼隨意服之以通為度

甘遂散

出危氏方

治大小便不通及腹滿氣急

用甘遂二兩赤皮者為末煉蜜二合和勻每一兩重分作四服日進一服蜜水下未知日二服漸加之一

方用二兩為散分五服熟水下如覺心下煩得微利  
日一服

治大小便不通

用羊屎燒薰鼻又主中惡心腹刺痛

又方

用搗葱白以醋和封小腹上

又方

用茱萸角枝斷取如手第二指中節含之立下

又方

用雄鼠糞兩頭尖者傳臍中立效

又方

用蓖實末五錢分二服新汲水調下

又方

用礬細研末令患人仰卧置礬末於臍中滿用新汲水滴之候覺冷透腹內即自然通若曾灸即於原灸盤上用紙作環子高火盤一指半已來著礬末在內

仍依前法滴之

木香丸 治重傷大小便不利腹痛

蒼朮

一兩

巴豆

十粒

瓜三稜

五錢炒

右為末白麵糊丸菜豆大每服五七丸食後薑湯下

治男女水火不通諸藥不能療

用篇竹生紫花香根水邊生者為佳研自然汁一盞服通即止藥不可便服補藥

檳榔散 治大小便不通亦治腸胃有濕大便秘澀

用欖榔至大者半枚用麥門冬熟水磨一錢重湯盪熱服之一方為末每服二錢蜜湯點服一方用童便葱白煎服

神仙導水丸 治上盛下虛水火不能升降大便祕澀小便不通赤眼口瘡便紅瀉血吐血洩痢不止者兼治諸積氣塊小兒脾疾婦人經脉不通男子打撲傷損等證

木香

兩

當歸

兩

枳殼

兩

炒

黃芩

兩

黃連

兩

青皮

兩

陳皮

一兩 檳榔

一兩

香附子

一兩

三稜

五錢

莪朮

五錢

大黃

三兩

黃蘗

三兩

牽牛末

三兩

右為末米糊為丸梧桐子大每服五十九丸米飲下不拘時服

祕傳解毒丸

治上盛下虛水火不能升降大便祕澀

小便不通赤眼口瘡便血瀉血吐血洩痢不止者兼治諸積氣塊小兒痺病婦人經脉不通男子打撲傷損等證

貫仲 山豆根 黃藥子 牙硝 寒水石 草龍

膽 乾葛 雄大豆 百藥煎 紫河車 甘草節

薄荷 梔子 大黃 豆粉

各四兩

右為細末煉蜜九秤一兩作十九外加銀箔為衣溫米飲下不拘時加山茨菰二兩大妙

大黃散 治大小便不通

大黃 五錢 甘草 五錢 滑石 五錢 菉豆 一合

右同研為細末每服二錢新汲水調下去滓服之立

效

治關格脹滿大小便不通

用獨頭蒜燒熟去皮綿裹納下部氣立通

治大小人腹中諸疾疳濕大小便不通

以羊糞煮湯下灌

輕粉散 治大小便秘

用大棗十枚真輕粉一匣每一箇入輕粉少許合住以盞子盛覆之煮湯甑上蒸熟細嚼白湯下人虛者



不宜用

蓮心散 通陰陽利大小便妙方

蓮心

四十九粒  
上焙乾為末

建茶

一小匙  
蜜一匙

右作一服用井花水半盞調勻服之立效

治大小腸並不通

用桃葉取汁和服半升冬用桃樹皮

利大小便去腹中結熱目下黃

以田中螺食之

調中下腸胃熱氣利大小便

用好井水及土石間新出泉水多飲之令至喉關即

消下

治大小腸風熱

取猪腸臟服之

治大小便闕格不通

出本草

取黃麻汁煮粥食之

一方

出永類  
鈴方

治大小便皆祕加腹脹如鼓氣促

大麻子

炒去殼  
五錢

八角茴香

七箇

右作末生葱白三七箇同研熟湯調五苓散又三和散加王不留行麥門冬

治宿食便秘而喘

出永類  
鈴方

沈香

三錢

青皮

淨七錢

三稜

七錢

莪朮

七錢

巴豆

三十一粒  
去殼

右同三味炒去巴豆加淨陳皮三錢製半夏製枳殼各一兩檳榔砂仁各五錢白茯苓淨香附子各五錢甘草三錢炙薑煎服

治大小便不通

老鷄眼睛草

味甘溫生江湖間葉如茄子菜故名天茄或云漆姑草也漆姑即蜀羊泉已見

本經人亦不能決識之

木通

胡荽

右三味煎湯服之

治小便不通臍下滿悶

海金沙

一兩生湖南山谷中今處處有之初生作小株高一二尺七月採得日中曝乾以紙

視擊取其沙于紙上旋曝旋擊沙盡乃止

蠟面茶

五錢

右二味搗碾令細每服三錢煎生薑甘草湯調下服

無時未通再服

大便祕澀不通

附論

四十四難曰七衝門何在然脣為飛門齒為會門戶厭為吸門胃為賁門太倉下口為幽門大腸小腸會為闌門下極為魄門故曰七衝門也易老曰魄門對飛門其證為狐惑之病以下衝上故曰七衝門也幽門不通上衝吸門會厭噎大便秘氣不得上下治在幽門閉大便不通以通幽湯主之○夫胃大小腸膀胱者倉廩之

本營之居也名曰氣能化糟粕轉味入出者也人或傷於風寒暑濕盛熱發汗利小便走枯津液致腸胃燥澀祕塞不通皆外所因或臟氣不平陰陽闕格亦使大便不通名曰臟結皆內所因或飲食燥熱而成熱中胃氣強澀大便堅閉小便頻數謂之脾約屬不內外因既涉三因亦當隨其所因而詳治之燥則潤之澀則滑之祕則通之約則緩之各有成法○燥乾者全肺之本燥金受熱化以成燥令更兼火熱致金衰耗液而損血鬱而

成燥者由風強勝濕熱能耗液故經云風熱火同陽也  
寒濕燥同陰也又燥濕小異也今燥雖屬秋陰而其性  
異於寒濕而反同於風熱火也又加大便燥乃是大腸  
受熱化成燥澀經云諸澀枯涸又如癰患中風皆因火熱  
耗散血液玄肺閉塞不能浸潤金受火鬱不能發聲經  
云肺主聲肢痛痠戾者風熱濕相持而遂以偏枯成燥  
澀手足不隨也然中寒吐瀉亡液而成熱亦已鮮矣以  
有寒濕相鬱榮衛不開發貫主氣而成偏枯經云諸澀

枯涸乾勁皴揭屬於燥也○若風氣壅滯腸胃乾燥是謂風祕胃蘊客熱口糜體黃是謂熱祕下焦虛冷窘迫後重是謂冷祕或因病重後亡津液或因老弱血氣不足是謂虛祕或腎虛小水過多大腸枯竭渴而多祕者亡津液也或胃實燥結時作寒熱者中有宿食也治法雖宜和順陰陽然疎風散火去熱除冷導引補虛之法不可偏廢當審其證以治之○腸胃本實而又為冷熱之氣所并結聚不宣故令大便難也又云邪在腎亦令



大便難所以爾者腎臟受邪虛而不能制小便則小便利  
津液枯燥小腸乾澀大腸難及渴利之家大便亦難所  
以爾者為津液枯竭致令腸胃乾燥診其右手寸口人  
迎以前脉手少陰也經脉沈為陰陰實者病苦閉悶大  
便不利腹滿四肢重身熱苦胃脹右手關上脉陰實者  
脾實也病苦腸中怵怵一作伏如牢狀大便難脉緊而滑  
直大便亦難少陽脉微絃法當腹滿不滿者必大便難  
而脚痛此虛寒從上向下也○凡人五味之秀者養臟

腑諸陽之濁者歸大腸大腸者所以司出而不納也令停蓄蘊結獨不得疎通何也熱邪入裏則胃有燥糞三焦伏熱則津液中乾此大腸之挾熱然也虛人臟冷而血脉枯老人腸寒而氣道澀此大腸之挾冷然也腹脹痛悶胃痛欲嘔此證結聚以宿食留滯得之腸胃受風洄燥祕澀此證閉寒以風氣燔灼得之若氣不下降而穀道難噫逆泛滿必有其證矣劑良治法熱者三黃湯冷者金液丹宿食者脾積丸風祕者脾約麻子丸氣不

下降者枳殼桔梗湯然而大腸與肺為表裏大腸者諸氣之道路關焉熱則清利冷則溫潤積聚者決其壅邪鬱者疎其風又當流行肺氣也○諸有裏熱法當通利然大便難下腸頭熱腫而墜重者也更有熱有瘀血挾氣而血在下焦也當用黃連黃芩大黃輩下之於內以炒阿膠炒枳殼百藥煎為佐多入濃蜜並烏梅同煎薑一錢四五片亦可凡通利大便若用大黃巴豆等藥而大便不通陰陽關格水火不升降故也有熱者來復丹

用三黃薄荷泡湯下無熱者養正丹夾神保丸橘皮湯煎下○儒門事親書云大便燥結戴人過曹南省親姨表兄病大便秘澀無他證常不敢飽食則大便極難結實如鐵石或三五日如圓眼前星飛鼻血出肛門連廣腸痛痛極則發昏服藥則病轉劇烈巴豆芫花甘遂之類皆用之過多則困瀉止則腹燥如此數年遂為藥性暴急不服但卧病待盡戴人過因診其兩手脉息俱滑而有力以大承氣湯下之繼以神功丸麻子丸等藥使食

菠菱葵菜及諸羊血作羹百餘日充肥親知見駭之鳴  
呼粗工不知燥分四種燥於外則皮膚竭渴燥於中則  
精血枯涸燥於上則唇鼻焦乾燥於下則便苦結閉夫  
燥之病為是陽明化也水液衰少故如此然可下之當擇  
藥用之巴豆可以下寒甘遂芫花可以下濕大黃朴硝  
可以下燥內經曰辛以潤之鹹以栗之周禮曰以滑養竅  
○老人臟腑祕澀不可用大黃老人津液少所以臟腑祕  
澀更服大黃以瀉之津液皆去定須再祕甚於前只可

服寬潤大腸之藥更用槐花煎湯淋洗亦效更有老人發熱而大腸祕澀或因多服丹藥脾胃虛弱氣化不行遂為臟腑積熱須用神保丸得通瀉一行熱亦即退○有人因時疾瘥後祕塞不通遂致夭命大不可輕之凡大便不通皆因用滑膩之物及冷水致不通也病後面黃者即大便難○內經謂小腸移熱於大腸為慮癰夫小腸者受盛之官化物出焉大腸者傳道之官變化出焉二者皆以傳化為事今也小腸受熱移於大腸則陰

氣盛而津液耗津液既不能滑利故糟粕內結沈伏而  
為虛癥結聚腸間宛結大便秘澀是也

方

痢聖餅子 治年老人大便秘澀

草菓

去皮

石菖蒲

去毛

白茯苓

麻黃

去根節

厚朴

獨

活

枳殼

麩炒

藿香

白朮

細辛

洗去葉

吳茱萸

去梗

甘草

炙

木猪苓

去皮

蒼朮

浸

良姜

去蘆

防風

去頭

赤芍

藥

附子

炮去皮臍

藁本

去蘆

柴胡

澤瀉

半夏

製各等分

右吹咀每服三錢水一盞半薤白二條擘破煎至八分去滓食前空心稍溫服老人小兒量以加減用之忌生冷油膩之物

京三稜九 治瘰癧注氣刺痛大便祕澀

京三稜

木香

當歸

桂

去粗皮

肉蓯蓉

酒浸切焙

牛

膝

去苗葉浸切焙

羌活

去蘆

芍藥

赤芍藥

防風

去蘆

枳殼

去穰麩炒

白朮

錢各五

檳榔

生剉

郁李仁

去皮尖雙仁另研如膏

大黃

對炒各一兩



右除郁李仁外為末與郁李仁同研勻煉蜜杵九梧桐子大每服二十九空心米飲或溫酒下以利為度

茱萸湯

治脹滿閉塞不下

方見本門大  
小便不通類

大黃丸

轉氣治百病

川大黃

二兩  
剉炒

木香

乾薑

炮  
剉

赤芍藥

白朮

芍

礬

羌活

桂心

檳榔

郁李仁

浸  
皮炒  
去

右為末入巴豆研令勻煉蜜九梧桐子大每日空心或夜卧時以溫茶下二十九至五十九以利為度如

要快瀉良久以熱茶投之

搜風潤腸丸 治三焦不和胃膈痞悶氣不升降飲食

遲化腸胃燥澀大便秘硬

沉香 檳榔 木香 青皮 陳皮 京三棱

去穢 去穢 去穢

蘿蔔子 槐花 商殼 枳實 木通

炒 炒 麩炒 麩炒 各五錢

郁李仁

一兩 去皮

右為末煉蜜丸梧桐子大每服五六十丸食前煎木瓜湯下常服滋潤腸胃導化風氣一方有大黃無木

通米飲湯送下

大黃丸 調利胃腸祛逐壅滯推陳致新疎風順氣

川大黃劉炒 檳榔 大麻仁 郁李仁湯浸去皮尖炒各二兩 牛

膝去苗 芎藭 枳殼麩炒 獨活 防風去蘆 桂心 桃

仁各一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒

右為末煉蜜為丸梧桐子大每服三十九空心生薑湯下

大五柔丸 治臟氣不調大便不通和榮衛利九竅消

穀益血

大黃 芍藥 枳實 茯苓 葶藶 甘草 黃

芩

牛膝

各一兩

桃仁

一百枚

杏仁

四十枚

右為末蜜丸梧桐子大每服三九日三加至二十九

酒下

導水丸 下劑

大黃

二兩

黃芩

二兩

滑石

四兩

黑牽牛

四兩

另取頭末

加後項藥

甘遂

一兩去濕熱疼痛泄水消腫滿久雨則加依法製用

白芥子

一兩去微身走注疼

痛

朴硝

一兩退熱散腫毒止痛久旱則加

郁李仁

一兩散結滯通潤腸胃行

滯氣通血脉

樟柳根

一兩去腰腿沉重

右為末滴水丸梧桐子大每服五七十九或加至百臨卧溫水下

潤腸湯

一名當歸潤燥湯

治大便秘燥不通

升麻

錢二

生地黃

錢二

大黃

炒三分

紅花

三分

麻仁

錢一

桃仁

一錢與麻仁另研了入煎

右吹咀作一服水二盞先拌藥濕煎一盞去滓食前  
熱服一方有黃蘗無紅花

麻仁丸

出儒門  
事親書

郁李仁

去皮  
另研

大麻子仁

另搗二味  
各六兩

大黃

二兩五錢  
半生半熟

檳榔

五錢

乾山藥

防風

去蘆

枳殼

炒各七錢五分

羌活

木

香

各五錢  
五分

右為末入另搗藥攪勻煉蜜九梧桐子大每服二十  
九至三十九溫水下食後加牽牛滑石亦妙

大黃欬

出聖  
患方

治身熱煩燥大便不通骨節急痛

川大黃

濕紙裏  
煨五錢

杏仁

去皮尖畧  
炒五錢

梔子仁

五錢

川升麻

五錢枳殼

浸去穢  
炒五錢

生地黄

一兩

人參

二錢  
五分

黃芩

二錢  
五分

甘

草

炙二錢  
五分

右咬咀每服三錢生薑五片豉二十一粒小烏梅一

枚煎服一方用枳實

勻氣丸 治津液燥少腸胃挾風大便秘澀氣不勻

麻仁

另研  
二兩

人參

一兩

訶梨勒皮

一兩

枳殼

去穢  
炒一兩

桂皮

去粗皮  
一兩

木香

一兩  
五錢

郁李仁

湯去皮另  
研三兩

白欖榔

三兩  
大

黃

炙三兩

右為末入麻仁等膏再研勻煉蜜九梧桐子大每服  
三十九加至五十九溫熟水下不計時

枳殼湯 治大腸壅結不通腹脇脹滿膨悶不下食

枳殼

去穰麩  
炒一錢

甘草

炙剉  
一錢

大腹皮

剉三錢

牽牛子

一兩  
百

合一赤茯苓

去黑皮  
一兩

赤芍藥

三分

桑根白皮

三分  
郁李

仁

湯浸去皮尖雙  
仁陰乾五錢



右呖咀每服五錢水一盞半煎至八分去滓空心食  
前溫服以通為度

宣氣木香飲 治膈氣痰涎食不消化大便不通腹

中雷鳴

木香

桂

去粗皮

昆布

洗去鹹焙

檳榔

剉一半生一半炮

大黃

剉炒

半夏

湯洗七次去滑麴炒各五錢

芎藭

甘草

剉炙各一分

阿梨勒

煨去核

三分

右呖咀每服五錢水一盞半生薑一塊大棗拍碎煎

八分去滓食後溫服日三

五柔丸

出千金方

治祕澀及虛損不足食不生肌膚三焦

不調和榮衛利臟腑補三焦

大黃

一升用三斗米蒸

前胡

二兩

半夏

茯苓

芍藥

茯苓

芩

當歸

葶藶

細辛

各一兩

右為末蜜和搗萬杵丸如梧桐子大食後服十五丸後稍增之日再○崔氏云令人善飯消穀益氣有憂者加松實五錢菴蘭五錢服之緩中不如意

便服之又加黃芩一兩

檳榔九

出聖惠方

治腸胃冷熱不和大便壅秘食飯不消

化心腹妨悶

檳榔

一兩

訶梨勒皮

一兩

郁李仁

湯浸去皮炒一兩

川大黃

剉炒

一兩 柴胡

去苗三分

草豆蔻

去皮五錢

木香

五錢

吳茱萸

湯浸七次炒五

錢

右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十九食前生薑湯

下

涼藥子丸 治五臟腹熱痰涎壅塞煩燥口舌生瘡大

便秘結小便赤澀及小兒驚熱疳病

連翹

一兩五錢

牙硝

一兩二錢

甘草

生一兩二錢

大黃

一兩

石膏

五錢

薄荷葉

梔子

萊豆粉

各二錢

右為末煉蜜丸彈子大每服一二丸水化下日進二服

檳榔丸 治大腸祕澀冷熱相攻寒熱如瘧

檳榔

剉一兩

羌活

去蘆一兩

青橘皮

湯浸去白焙一兩

木香

一兩

郁

李仁

湯浸去皮另研

大黃

剉炒

大麻仁

另研各二兩

牽牛子

四兩搗細

取三兩

右為末入研藥令勻煉蜜九梧桐子大每服二十九生薑湯送下

牽牛子丸

出聖惠方

治臟腑壅滯心腹氣悶宿食不消腰

脇疼痛大腸祕澀

牽牛子

一斤半生用一斤炒

桂心

一兩

枳殼

麩炒去穰一兩

芎藭

一兩

木

香青橘皮

一兩湯浸去白焙一兩

郁李仁

湯浸去皮炒二兩

右為末煉蜜杵九梧桐子大每服二十九食前溫酒

下

治脹滿不通

出千金方

通草

四兩

朴硝

四兩

郁李仁

二兩

黃芩

二兩

瞿麥

二兩

車前子

五合一方六兩一方二升

右呔咀水八升煮取二升半分三服一方用絹袋盛

煮頓服二升

六合散

出宣明論

治一切燥結汗後餘熱宣轉不通亦名

金鑰匙散並治小兒腸氣結血腹滿胃中結病走注  
疼痛

大黃

一兩紙裹煨

白牽牛

生五錢

黑牽牛

炒五錢

甘遂

五錢

檳

榔

生三分輕粉

右為末每服一錢蜜水調下量虛加減

滋腸五仁丸

出醫方集成

治津液枯竭大腸祕認傳導艱難

桃仁

一兩

杏仁

炒去皮一兩

栢子仁

五錢

松子仁

一錢二分

郁李

仁

一錢炒

陳皮

四兩另為末

右將五仁別研為膏入橘皮末研勻煉蜜九梧桐子  
大每服五十九空心米飲湯送下

潤腸九

出醫方集成

治大便秘澀不通

杏仁

炒去皮尖

麻仁

陳皮

各半

阿膠

炒

防風

各二分

右為末煉蜜九梧桐子大每服五十九蘇子湯荆

芥湯任下

厚朴散

一名厚朴湯

凡臟腑之秘不可一例治療有虛秘

有實秘胃實而秘者能飲食小便赤當以麻仁九七



宣九主之胃虛而祕者不能飲食小便清利此湯主之實祕物也虛祕氣也宜詳治之

出衛生寶鑑

厚朴

薑製三兩

白朮

剉五兩

半夏麴

二兩

枳實

麴炒一兩

陳皮

去白

甘草

炙各二兩

右為粗末水煎空心溫服一方每服三五錢水一盞半生薑五片棗三枚煎至一盞去滓服云實祕者物也虛祕者氣也

七聖九

出和濟方

治風氣雍盛痰熱結搏頭目昏重涕

唾稠黏心煩面赤喉乾口燥精神不爽夜卧不安肩背拘急胃膈痞悶腹脇脹滿腰腿滿重大便秘結小便赤澀亦治大腸疼痛陣難當漸教稍瀉三焦是莫謾多方立臟傷大腸疼痛陣難當漸教稍瀉三焦是莫謾多方立紀綱

川芎

木香

生肉桂去粗皮

羌活

去蘆

檳榔

郁李仁

去皮另研

大黃

蒸焙剉用各一兩

右為末煉蜜九梧桐子大每服十五丸至二十九溫

熟水食後臨卧服嵐瘴之地最宜服之更量臟腑虛實加減取大便微利一服而愈切忌多利大便行其痛滋甚

七宣丸

出和濟方

治風氣結聚宿食不消兼砂石皮毛在

腹中及積年腰脚疼痛冷如冰石脚氣衝心煩悶霍亂頭旋暗倒肩背重痛心腹脹滿胃膈閉塞風毒腫氣連及頭面大便或秘小便時澀脾胃氣痞不能飲食脚轉筋掣手疼痛攣急心神恍惚眠卧不安等病

柴胡

去蘆 三兩

枳實

炒 三兩

木香

三兩

訶梨勒皮

三兩

桃仁

去皮

尖炒 三兩

甘草

炙四兩

大黃

麩裹 十五兩

右為末煉蜜九梧桐子大每服二十九米飲食後臨  
卧服稍增至四十五十九取宣利為度覺病勢退服  
五補丸不問男女老少並可服餌量虛實加減一方  
酒服

通幽湯

一名導滯通幽 湯出東垣方

治大便難幽門不通上衝吸

門幽門噎塞大便燥閉氣不得下治在幽門以辛潤

之

當歸

錢一

升麻

錢一

桃仁

研一錢

生地黃

錢五

熟地黃

錢五

紅

錢五

紅

花

錢一

甘草

錢一

右咬咀作一服水二盞煎一盞去滓調檳榔細末五

分稍熱服

潤體丸

郁李仁 大黃 黑牽牛 桂心 當歸 黃蘗

生用各輕粉少許

五錢

右為末酒水九梧桐子大每服三十丸至四十丸溫水或生薑湯下

寬快湯 治氣不升降大腸澀滯

香附

杆淨二兩

天台烏藥

去心一兩

枳殼

製一兩

縮砂仁

七錢五分

蘇子

炒五錢

青木香

三錢

甘草

炙七錢五分

右為末每服二錢陳皮煎湯調下或吞青木香丸少許

脾積丸

出角氏方

治飲食停滯腹脹痛悶嘔惡吞酸大便

秘結積滯停結

蓬莪朮

三兩

京三稜

二兩

良姜

五錢已上用醋一升于瓶內煮乾乘熱切碎焙

青皮

去白一兩

南木香

五錢

皂角

不蛀者三大挺燒灰存性

百草霜

三匙

村庄家鍋底者佳

右為末用川巴豆半兩只去殼研如泥漸入藥末研

和麩糊丸麻子大每服五十九加至六十九橘皮煎

湯送下

感應丸

出危氏方

治飲食所傷三焦氣滯大便秘澀

百草霜

用庄農家鍋底上者研細秤二兩

新揀丁香

一兩五錢

川乾薑

炮裂一兩

杏仁

去雙仁揀肥者一百四十粒去尖湯浸一宿去皮另研極爛如膏

南木

香

去蘆二兩五錢

肉豆蔻

去粗皮用滑皮仁二十粒

巴豆

七十粒去皮心膜研細出

盡油

如粉

右除巴豆粉百草霜杏仁為末同拌研令細用好蠟六兩鎔化作汁以重綿濾過去滓更以好酒一升於銀石器內煮蠟鎔滾數沸傾出候酒冷其蠟自浮於上取蠟秤用凡春夏修合用清油一兩於鉢內熬令



末散香熟次下酒煮蠟四兩化作汁就鍋內乘熱拌  
和前項藥末秋冬修合用清油一兩五錢同前者熟  
作汁和蠟合藥末成劑分作小錠子以油紙裹之旋  
丸服餌

潤腸丸

出御藥院方

治津液耗少大便秘澀下焦氣滯常

服消食祛熱潤燥

葳靈仙茸

一兩五錢

郁李仁

去皮五錢

木香

二錢

枳實

麩炒二錢五分

麻仁

七錢五分

檳榔

三錢

人參

三錢五分

右為末煉蜜九梧桐子大每服三十九至五十九生薑湯下

木香檳榔九 治胃氣虛弱飲食無味上膈塞壅冷積癥癖瘕氣食不消化肺氣積聚心胃痰逆喘急卒中風毒脚氣大腸祕澀奔豚氣痛

木香 檳榔 羌活去蘆 芎藭 桂去粗皮 郁李仁

去皮雙仁研 大黃剉炒各二兩

右為末與郁李仁同研勻煉蜜九梧桐子大每服二

十九食前生薑湯下或諸氣痛溫酒下

治闕格大便不通

出千金方

芒硝

五兩

烏梅

五兩

桑白皮

五兩

芍藥

四兩

杏仁

四兩

麻仁

三兩

大黃

八兩

右咬咀水七升煮三升分三服一方無烏梅加枳實

乾地黄各二兩外臺祕要有榆白皮無桑白皮分兩

同

大戟丸

出聖惠方

治腸胃積滯大便不通氣壅上奔

大戟

劉炒一兩

羌活

一兩

陳橘皮

湯浸去白焙一兩

桑根白皮

劉一

兩

川大黃

劉炒二兩

木香

五錢

牽牛子

四兩炒取末二兩

右為末煉蜜九梧桐子大每服二十九空心薑湯下

麻仁丸

出聖惠方

治大便秘五臟氣壅三焦不和熱結祕塞

大麻仁

二兩

川大黃

劉炒

枳殼

赤芍藥

川芒硝

郁李仁

湯浸去皮尖

檳榔

各一兩

右為末煉蜜九梧桐子大每服三十九空心生薑湯

下

檳榔散 治大腸卒不通腹脇脹滿氣上充心膈

檳榔

枳殼

麩炒  
去穢

牽牛子

炒

桑根白皮

剉

川大黃

剉炒 郁李仁

湯洗去  
皮尖炒

陳橘皮

湯洗去白  
焙各一兩

右咬咀每服四錢水一盞煎至六分去滓溫服

檳榔九 治臟腑壅滯心膈妨悶大小腸不利

檳榔

五錢

郁李仁

浸去皮  
炒五錢

川大黃

剉炒  
五錢

木香

五錢 木通

剉五錢

青橘皮

湯浸去白  
焙三分

牽牛子

炒二兩

右為末煉蜜為九梧桐子大每服二十九食前溫水

送下

檳榔九 治一切氣臟腑壅滯

檳榔 桂心 枳殼麩炒去穢 木香 訶梨勒皮 郁

李仁湯浸去皮炒 川大黃剉炒各一兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十九溫酒下

麥門冬湯 治虛熱痰實二焦痞結溫壯煩熱大便不通

麥門冬去心焙三分 赤茯苓去黑皮五錢 甘草炙剉五錢 黃芩去黑

心五錢

大黃

剉炒五錢

赤芍藥

一兩

右㕮咀每服五錢水一盞半入竹葉十片生薑一片棗六枚拍破煎八分去滓食前溫服日三

牽牛子丸 治大便秘不通消除痞氣

牽牛子

生搗末一兩五錢

甘遂

剉炒五錢

京三稜

煨剉三分

木香

三分

陳橘皮

湯浸去白焙三分

訶梨勒皮

煨去核三分

右為末用薑四兩絞取汁白蜜五兩煎成膏和丸藥劑杵丸如梧桐子大每服二十九卧時煎粟米飲下

未利加至三十九

大黃丸

一名透關散  
出聖惠方

治大便不通下焦傷熱壅塞

大黃劉檳榔

川芒硝

枳殼

麩炒去穢  
各一兩

木香

子芩

各五錢

右咬咀每服四錢水一盞生薑五錢葱白七寸煎至

六分去滓空腹溫服未通再服

牽牛子丸 治大便卒不通心神煩悶坐卧不安

牽牛子

二兩  
炒

川朴硝

大麻仁

川大黃

劉  
炒木香



各一  
兩 甘遂  
錢 蠟 五

右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十九空心生薑湯

下未通再服

木香丸 治大便秘不通心腹氣滿悶

木香

兩 一 檳榔

兩 一

川大黃

剉 炒 一 兩

桂心

錢 五

川烏頭

炮 去 皮 臍

錢 五 巴豆霜  
分 一

右為末入巴豆霜令勻煉蜜丸梧桐子大每服三九  
加至五九空心橘皮湯下

檳榔丸 治上焦壅熱閉塞頭目不利大小腸祕澀心

腹滿悶

檳榔

一兩

羚羊角屑

一兩

前胡

去蘆一兩

大麻仁

一兩

牽牛子

三兩

枳殼

一兩五錢 麩炒去穰

右為末煉蜜杵丸梧桐子大每服三十九食前生薑

湯下以利為度

芒硝丸

出千金方

治脹滿不通

芒硝

一兩五錢

芍藥

一兩五錢

黃芩

一兩六錢

杏仁

二兩

大黃

二兩

右為末煉蜜九梧桐子大米飲服十五丸加至二十丸取通利為度日三服

擒虎散 若有前證或臟腑稍實宜間服擒虎散二兩

服疎導腸胃中滯澀鬱結毒氣

前證搜風潤腸  
九治證在前

沒藥 當歸 黑牽牛

生 大黃

各一兩

甘草

生一錢

右吹咀每服五錢用皂角刺七箇搗破隔宿酒一升浸之來日取酒一盞更加水一盞入枯婁子七粒煎至七分放溫食遠服以利為度

潤腸丸 治大腸風結氣滯

肥皂角

五片醋炙焦去皮子五片生用去皮子二味共為末五片水一升採取濃汁聽過慢

火炒銀石器內熱成膏子入後藥

南木香

一分

青橘皮

去穢一分

陳橘皮

去白 檳榔 一分生用

右為末和皂角膏搜成劑看得所後如硬入少蜜丸  
梧桐子大每服三十九空心溫酒送下

治大便不通即時透

大黃 木通 枳殼 甘草 荊芥

等分

右為末每服三錢水一盞煎去滓服

木香遂氣丸 治食積虛滯通利大便無治腳氣小腸

氣諸氣攻刺腹痛

橘紅

五錢

青皮

去白五錢

檳榔

雞心者五錢

南木香

五錢五分

川巴

豆肉

一錢半研如泥  
八前藥和研

右為末生薑自然汁調神麴末為餅丸麻子大每服  
十九薑湯送下如氣攻腹痛枳殼木瓜煎湯下

枳殼散

治虛勞大便秘澀

枳殼

五兩

甘草

炙一兩五錢

杏仁

去皮炒

阿膠

炒酥

生地黄

各一

兩

右剉如麻豆大每服三錢生薑五片蜜三匙烏梅一枚煎空腹服

大黃丸

治脾胃不和內有蟲滯大便秘難

大黃

剉炒三兩

赤芍藥

三兩

厚朴

去粗皮薑汁炙三兩

枳實

去穢麩炒一兩

五錢大麻仁

另研如膏五合

右四味搗為細末與麻仁同研令勻煉蜜杵丸如梧

桐子大每服十九加至十五丸食前溫水下以通利  
為度薑湯下亦可用

麻仁散 治大便秘不通腹內壅悶氣喘息促

大麻仁

研如膏

大黃

劉炒

葛根

劉各一兩五錢

桑根白皮

劉

芒

硝

生鐵銚內炒

右三味同芒硝麻仁研勻煉蜜和劑搗熟丸梧桐子  
大每服二十九空心煎粟米飲下至晚再服一方無  
葛根煎薑湯送下

治大便不通胃腹妨悶不下飲食

烏巢子

二兩

木香

一兩

芎藭

一兩

青橘皮

湯浸去白

焙一兩

川大

黃

三兩  
剉炒

右搗為細末煉蜜九如梧桐子大每服二十九以葱

白生薑煎湯送下

麻仁丸 治大便秘澀虛癢不通及一切壅熱

大麻仁

另研膏  
三兩

大黃

剉炒  
三兩

枳殼

去穢麤炒  
一兩五錢

厚朴

去粗

皮薑汁  
炙三兩



右三味搗為細末與麻仁同研煉蜜杵九梧桐子大  
每服二十九空溫水下以利為度一方塗酥杵令  
勻熱丸溫酒送下

木香

三兩

枳殼

去穰麤炒三兩

川大黃

剉炒四兩

牽牛子

炒四兩

訶

梨勒皮

三兩

右搗羅為細末煉蜜九梧桐子大每服三十九食前  
以薑湯下

大麻仁丸

治積年心腹氣肺氣脚氣冷熱氣瘰癧氣

不能飲食縱食不消臟腑不調大腸祕認

大麻仁

三兩另研如膏

川大黃

剉炒三兩

訶梨勒皮

三兩

人參

去蘆

一雨陳橘皮

湯浸去白焙一兩

右為末煉蜜杵丸梧桐子大每服二十九食前薑湯下如未利加至三十九酒下亦得此藥益利多不損人

治大便秘通

大戟

升一

大豆

升五

商陸

升三

牛膝

升三

右為呔咀水五升煮二升以大豆五升煎令汁盡至  
豆乾初服三枚以通為度

治大便難

豉清 醬清 羊酪 土瓜根 汁

右和勻灌之立通

香枳湯 治大便秘結調風順氣

枳殼 防風 檳榔 甘草 各一兩

右為末熱湯調二錢空心服

四磨湯 治氣滯腹急大便秘結及老人虛秘

大檳榔 沉香 木香 烏藥

右搗盆內各磨半盞和勻溫服有熱者加大黃枳殼

名六磨湯

潤腸湯 治大便秘澀連日不通

麻子仁

一錢五分細研用水浸去皮取濃汁

芝麻

半升炒研用水浸取濃汁

桃仁

湯浸去皮麩炒研如泥

荊芥穗

搗末各一兩

右用前藥入鹽少許煎可代茶飲之以利為度如煎

茶不宜煎過食前

南木香丸 治大便秘結

南木香

不見火

檳榔

麻仁

枳殼

各等分

右先將枳殼去穰每箇切作四片用不蛀皂角三寸生薑五片巴豆三粒畧搥碎不去殼用水一盞將枳殼同煮候滾濾去生薑巴豆皂角不用只將枳殼焙乾研細為末入前木香檳榔麻仁同末煉蜜丸蜜湯下

寬氣湯 利三焦順臟腑治大便多秘

香附子

潔淨新沙盆內  
焙乾秤六兩

烏藥

用天台真者去  
心取肉秤二兩

縮砂

一甘草

炒一兩

右為末每一大錢濃煎橘皮湯下不拘時一方有杏

仁枳殼

穿結藥 治大實大滿心胃高起氣塞不通者為結

也

蟾酥

麝香

輕粉

巴豆

少許  
另研

右再研至細孩兒乳汁為丸黍米大二粒生薑湯下  
無時

藏用丸

大黃

二兩

黃芩

二兩

滑石

四兩

黑牽牛

四兩

右為末水丸梧桐子大每服五七十九食前溫水  
下

小通氣散 治虛人憂心傷肺肺與大腸為傳送至  
今祕澀服燥藥過大便秘

陳皮

去白

蘇軟莖葉

枳殼

去穰

木通

去節

去皮

右等分㕮咀每服四錢水一盞煎溫服立通

承氣瀉胃厚朴湯

治胃實腹脹水穀不消溺黃體

熱鼻塞衄血口喎脣緊關格不通大便苦難

厚朴

去粗皮生薑湯炙三錢

大黃

剉炒二兩

枳殼

去穰麩炒

甘草

炙各五錢

右㕮咀每服五錢水一盞半煎一盞去滓空心溫服

取利為度

升麻湯

治強壯人熱毒流入腸胃骨節疼痛腹中煩



滿大便秘澀

升麻

四兩

大黃

剉妙四兩

前胡

去蘆

梔子仁

炒各三兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎七分去滓食前溫服未通再服

平胃煮散 治大病後重亡津液及老人津液不足大

便秘澀

厚朴

去粗皮薑汁炙五兩

蒼朮

去粗皮米泔水浸一宿焙八兩

陳橘皮

湯浸去白

焙五兩

甘草

炙三兩

右吹咀每服三錢水一盞加青橘皮末五分生薑二片棗二枚擘開煎一盞去滓溫服

滌中丸 治宿食不消大便難及腸胃受熱瘕聚沉慮時行結熱

大黃

剉炒  
八兩

葶藶

隔紙炒  
二兩

杏仁

去皮尖雙  
仁炒研

芒硝

研各  
四兩

右為末煉蜜九梧桐子大每服五九至七九食後溫水下日三未通加至十九一方有青橘皮名大黃九空心生薑湯下

半夏丸 治大便秘不通疎風轉氣下痰

半夏

湯浸去滑七次麩炒一兩

牽牛子

四兩半生半炒

木通

剉五錢

青橘

皮

湯浸去白焙五錢

右為末煉蜜和劑搗熟九梧桐子大每服四十九夜卧時淡生薑湯下

大黃湯

出千金方

治大便秘不通或大腸熱結風秘

大黃

剉炒

黃芩

去心

梔子仁

甘草

炙剉各一兩

右吹咀每服四錢水一盞半煎八分去滓下滑石五

分更煎兩沸空心溫服若大秘加滑石二兩

枳實丸 治風痺痰實大便秘澀頭眩暈腹滿煩渴

傷寒胃熱有燥屎譫言狂亂及結胃痛痞癰瘍瘡疾

大黃

五錢

牽牛

炒取末五錢

枳實

麩炒去穰

人參

一錢

右為末水丸黍粒大量人大小三五十丸或百丸水

下

治大便閉不通

皂角末 蒜

右同搗爛貼臍心一方用皂角二挺去黑心皮為末  
煉蜜九梧桐子大每服三十九空心溫水下

雞脰骨九 治反胃大便難肌膚乾瘦

雞脰骨

慢火煨  
三兩

大黃

剉炒  
五兩

大麻仁

研如膏  
四兩

右為末與麻仁同研煉蜜杵九梧桐子大每服二十

九米飲湯下

牽牛子九 治腹氣脹滿大便秘澀腹脇刺痛

牽牛子

三兩半  
生半炒

檳榔

生剉  
二兩

木香

一兩

右為末煉蜜九梧桐子大每服二十九空心溫酒下  
或米飲湯下亦可

炒桃仁法 治裏急後重大便不快

桃仁

去皮  
三兩

吳茱萸

二兩  
鹽一兩

右同炒熟去鹽并茱萸只以桃仁空心夜卧不拘時  
任意嚼五七粒至三十粒

大腹湯 治老人虛秘

陳大腹皮

十五枚

木瓜

一枚

葱白

五莖

右吹咀水五盞煎至二盞半去滓分溫五服

三仁丸

治大腸有熱津液竭燥裏急後重大便秘澀

松子仁

栢子仁

大麻子仁

各一兩

右研令勻黃蠟五錢鎔汁九梧桐子大每服十九空心食前米飲下未快加九數服一方白蠟丸黃丹湯

服之治老人虛秘

治五實病大腸難

川大黃

剉炒

郁李仁

湯浸去皮  
炒各二兩

吳茱萸

五錢湯浸七  
次焙乾炒

朴硝

二兩  
五錢

右為末每服三錢食前蜜水調下以利為度

治大便卒不通氣上奔心膈

皂莢

出黑皮塗  
酥炙去子

五靈脂

各一兩

巴豆霜

一分

阿魏

五錢  
麝裹

煨

右為末煉蜜九菜豆大每服五九生薑湯下未效再服

牽牛子丸

治臟腑壅滯心腹氣悶宿食不消腰脇疼



痛大腸祕澀

牽牛子

十兩取  
末六兩

木香

五錢

青橘皮

湯浸去白  
焙五錢

檳榔

五錢

右為末與牽牛子末和勻煉蜜杵丸梧桐子大每服  
二十九食前溫酒下一方醋糊為丸米飲下薑湯亦  
可

治大便秘

醬清

三升麻油

二升葱白

三寸

右合煮令黑去滓待冷頓服一方不用醬清

歲靈仙丸

治年高氣衰大便祕結

黃耆

蜜炙

枳實

歲靈仙

各等分

右為末蜜丸梧桐子大每服五七丸薑湯熱水下

方用防風忌茶

大黃通格丸

黑牽牛

大黃

木通

各五錢各另取末

右

闕

摩臍方

治大便秘腹脹

杏仁

湯浸去皮尖雙仁者三七枚生用

葱白

三莖去鬚葉切

鹽

一分

右研如膏每服取如酸棗大許塗手心摩臍上三百轉須臾即利不止以冷水洗手即定

腸結方

治病後津液燥少大便不通

猪膽

一枚取汁

沙糖

少許

糯米

二合燒灰存性研細

右研如膏以少許入下部立通

治大便不通或熱結或風閉及婦人產後大便不通

皂莢

二挺去皮炙令黃為末

白梅肉

五枚蜜少許

右將白梅肉與蜜拌和皂角末如棗大以綿裹引內下部中須臾即通

穿腸湯 治大便七八日不通服諸藥未效者

猪膽

一枚取汁

蜜

二兩

膩粉

一錢

右煮可丸入膩粉捏如中指長內下部立通

濡臟湯 治大便不通六七日腹中有燥糞寒熱反迫

短氣

關

汗腹滿

生葛根

二錢

猪膏

二錢

大黃

一兩

右呖咀水五升煎二升去滓入膏煎三沸澄清強人頻服瘦人再服亦治大小便不通

猪膽導方 治大便六七日不通奔氣上衝

用雄猪膽一枚繫口頭內下部漸解開頭倒瀉入肛門須臾即通利

枳殼丸 治大腸結實

枳殼

麩炒去穰

川大黃

劉炒

川芒硝

各一兩

右為末煉蜜丸梧桐子大食前生薑湯下三十丸

治大便卒不通澀結

吳茱萸

生五粒

梔子

十四枚

川朴硝

一兩

右水一大盞煎至六分去滓下朴硝空心分三服

治上氣大便祕澀

杏仁

五兩去雙仁皮尖熬

印成鹽

三兩

乾薑

三兩

右搗篩以醬汁和之令稀稠相得可長一寸餘如指大兩頭尖仍以薄綿裹之於風日中曝令少乾內下部中時時易之不過一易即有惡物下氣上即定亦

下食內藥痛時忍少頃如深內少頃亦不甚痛急出時  
物即出待痛定之後即得便利特出膿及惡物多大  
便不澀停之

治大便不通

菖蒲

石鹽末

各一兩

右相和取半匙和烏麻脂少許綿裹內下部即通

治大便難

醬清 烏梅

右將醬清漬烏梅灌下部中

又方

桑根白皮 榆根白皮

各一握

右咬咀水三升煮取一升半分三服

又方

猪脂

一兩

葵子

一兩五錢

右將葵子為末猪脂和丸每服十丸溫水服一方水

三升煮取一升空心服



又方

葵子 牛酥

各一升猪脂亦可

右水四升煮葵子取一升内酥煮一沸待冷分作二分

又方

葵子

汁

乳汁

右等分和服之立出一方單用葵根汁生服

治大便秘塞不通

猪膽 羊膽

右用猪羊膽

闕

灌三合許令深入即出矣出

不盡須臾更灌一方加冬葵子汁和之妙又椒豉湯五升和猪膏三合灌之佳臨時易可得即用之又無灰濃酒半升鹽三錢煉成如上法

紫蘇麻仁粥 順氣滑大便男婦皆可用體虛之人風祕結燥服之皆得力

紫蘇子

麻子仁

各不拘多少

右研爛水濾取汁煮粥食之○風科集驗方許學士  
云常有一貴人母年八十四歲或腹痛頭疼惡心不  
能食藥醫家供補脾進食治風清頭目藥疾數月益  
甚懇予辦之予曰悞矣此老人風祕臟腑壅滯聚膈  
中則腹脹惡心不喜食至顛頭痛神昏如得臟腑暢  
諸疾悉去予進蘇麻粥而氣洩下結糞十餘塊少間  
通利諸證悉除

牛黃散 治上焦積熱臟腑祕結

大黃

一斤

白牽牛

頭末  
五錢

右為末有厥冷用酒調下三錢無厥冷手足煩蜜湯

調下

小提盆散

治大便秘結服轉藥久不通

竈突墨

錢一

滄鹽

錢三

右研勻竹筒吹一錢肛門內立透

治大便秘通

當歸

香白芷

各等  
分

右為末每服二錢溫米飲湯調下

葱白散 治老人及虛人大便不通

葱白

三片 阿膠一

右以水煎葱候熟不用却入阿膠鎔開溫服一方用  
蜜二匙鎔服又以酢和葱封臍通吳內翰母夫人曾  
服得效

黃耆湯 治年高老人大便祕澀

綿黃耆

陳皮

去白皮  
各五錢

右為末每服三錢用大麻仁一合研爛投取漿一盞  
濾去滓於銀石器內煎候有乳起即入白蜜一大匙  
再煎令沸調藥末空心食前服祕甚者不過兩服愈  
常服無祕澀之患此藥不冷不燥其效如神一方用  
枳殼五錢

蜜兌法 治閉結腸熱及肛塞腫縮生瘡

蜜三合猪膽

汁二枚

右以蜜入猪膽汁在內煎如飴以井水浸冷候凝撚

如指大長三寸塗油納下部立通活人書單用蜜一方入皂角末在人斟酌用之一方入薄荷末代皂角用尤好又或偶無蜜只嚼薄荷以津液調作挺用之一方無猪膽

治大便不通

猪糞 猪羊膽

右以葦筒著膽縛一頭內下部入二寸灌之八錢立下

治人有腸結之患

天麻十兩 蒺藜子

一鎰 緩火熬焦熟

右先安置天麻於瓶中上用火焰過蒺藜子蓋內外  
便用三重紙蓋並繫從已至未時又出蒺藜子再入  
熬炒準前安天麻於瓶內用炒過蒺藜子於中依前  
蓋又隔二服時後出如此七徧瓶盛出後用布拭上  
氣汗用刀劈剖焙之細剉搗用御風草修事法亦同  
天麻



提盆散 治大便秘澀服藥轉取不通者

滄鹽

版塊  
三錢

屋簷爛草節

七箇

右為末研勻每用五分至一錢竹筒吹在肛門內寸  
深立效

潤腸橘皮丸 降氣潤腸調和五臟並治三焦氣壅大  
便秘澀老人虛弱服不損氣及治風秘

橘皮

一方用  
橘紅

杏仁

去皮尖雙仁麩  
炒黃各等分

右為末煉蜜丸梧桐子大每服五十九空心溫水下

一方米飲下

牽牛散 治大便秘澀

牽牛子

半生半炒 檳榔 生剉各五錢

右為末每服三錢生薑湯調下未利良久熱茶投  
疏利為度

大豆豉方 治諸風濕痺筋攣膝痛胃中積熱口瘡  
煩燥大便秘澀

大豆黃豉

炒熟搗末一升 酥 五錢

右研勻不拘食前後溫水調下一匙

甘遂散 治大便秘澀不通

甘遂

一兩  
炒

木香

一分

右為末每服一錢溫酒調下不拘時

荊芥散 治大便不通無問新久癰悶不通小腹急痛肛門疼痛

荊芥穗

一兩

大黃

二兩  
並生用

右為末每服二錢生薑蜜湯調下未通再服

商陸煮豆方 治大便不通

商陸

乾者大戟 剉炒  
一分

右咬咀水四升棗十枚去核煎一升半黑豆半合煎水盡乾取黑豆初吞三粒稍加之以通利為度滑石散 治大便不通腹脹氣急妨悶

滑石

三兩  
細研

手足指甲

萬患人自身者燒灰  
研極細各分二貼

右取滑石末每貼水一盞半煎八分去滓調勻指甲

灰空心辰時服

粉糖丸 法大腸壅結不通

膩粉

五分沙糖如彈丸大一塊

右研令勻九梧桐子大每服五丸臨卧溫水下

皂莢散 治大便不通

猪牙皂莢

去皮酥炙五錢

蒺藜子

炒去角五錢

右為末每服一錢鹽茶湯調下

大黃丸 治大便不通

大黃

剉炒五兩

大麻仁

研二兩

右為末煉蜜九梧桐子大每服十九食後熱水下

治肛門肺熱閉塞不通腫縮生瘡

蜜乾薑

末

右和九如指大導下部姚云欲死者蜜三升微火煎如飴投冷水中令凝九如指大長三四寸導之良  
一方水四升蜜三升煎熟冷灌下部又常服蜜煎  
五合

大黃芒硝丸 治大便暴閉不通氣悶絕

大黃

六兩

芒硝

五兩

一方

用朴硝

右先切大黃水四升煮取二升去滓入芒硝頓服之  
須臾利如良久不覺以熱飲投之一方為末每服一  
錢溫米飲調下

治乾糞塞腸癥腸脹痛不通

毛桃花

一兩

麵

三兩

右和麵作餛飩熟煮空腹食之日午後服如雷鳴當  
下惡物得效

治大便秘日不通

鼠糞

二枚

白膠香

半棗大

右為末水和如棗核大油塗內穀道中良久便通

又方

膩粉

一分

黃丹

一錢

右為末每服一錢粥飲調下

治臟腑壅塞心腹氣悶宿食不消腰脇疼痛大腸祕澀

牽牛子

一片炒搗取末十兩

青橘皮

三兩去白湯浸焙為末



右都令勻杵和蜜丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸食前溫酒下生薑湯亦可

治大便不通

用白礬石如指大導下部佳

又方

用漢瓜蒂七枚綿裹內下部如非時醬瓜亦得

治卒大便秘澀不通

用削瓜蘆如指大導下部中即效

又方

用蜜和燕屎內大孔中即通又方蜜一升水四升煮  
熟冷灌下部中

治大便難

用桃皮三升水五升煮取一升頓服一方水服桃花  
方寸匕無花白皮亦得又方桃葉取汁服亦佳

又方

用車前子及葉常服良

治脹滿不通

用獨頭蒜燒熟去皮以綿裹內下部中氣立通及乾薑鹽杏仁搗丸導之並佳

巴豆丸 治寒癖宿食久飲飽不消大便不通

用巴豆仁一升擣酒五升煮三日三夕後合酒微火煎令可丸如胡豆大欲取吐下者服二九一方巴豆一粒去皮油心膜粳米飯二十粒丸如菉豆大溫水下三九

蜜劑方

一名霹  
虛箭

治大便久秘攻不透肺熱應肛門

熱閉塞生瘡

用蜜不拘多少慢火熬令作劑稀則粘手硬則脆稀稠得所堪作劑搓如棗核大粗如箸長一寸許蘸油內于肛門中坐良久自透或加減少許一方可丸六七寸內肛門中到身向上頭下少時取痒即通加鹽相合亦可用草烏頭末相合亦可鹽則軟堅潤燥草烏末則祛寒消結可隨證陰陽所宜用之

治虛人並老弱人虛秘

用大麻仁不計多少研細用水濾取麻飲以米相和  
煮粥或者煮蘿蔔食之一方水調服又方常煮子汁飲  
蜜五合常服亦妙熟湯濾汁服亦可

蜜煎藥 治大便不通

用明黃蠟不拘多少油少許鹽少許熬作錠子放入

肛門

治大便秘澀不通

用牽牛子半生半熟為末每服二錢煎薑湯調下  
如未通時再服及熱茶投之量虛實無時候加減  
服

治大便不通氣奔欲死

用烏梅十枚置湯中須臾去核為丸如棗大內下部  
少時即通

治大腸久冷秘

用葳靈仙蜜丸梧桐子大於一更內生薑清米飲下

十九至二十九

治大便澀結

用陳皮不去白酒浸煮至軟焙乾為末復以溫酒調服二錢為妙一方以米飲湯調下

治大便秘澀不通

用蜣螂不拘多少去翅足為末熱酒調下一錢

治卒大便秘澀不通

用綿裹鹽丸作三九如手指大內下部中一方用食

鹽和苦酒傳臍中乾即易

敷藥 治閉結至急昏不知人

用生大螺螄三枚以鹽入殼内生搗碎置病者臍下一寸三分用寬帛緊緊繫之即大通未效烏柏木三寸研井水服亦效就多研爛咽下亦可

治大便不通

用烏柏木一寸許擘破以水煎取小半盞服之立通甚效



去燥糞

用生薑削如小指長二寸鹽塗內下部中立通

治下部閉不通

用蒴藿根一握搗汁水和絞去滓強人服一升數用之並治腳氣

治大便卒澀結不通

用羊蹄根一兩剉水一大盞煎取六分去滓溫頓服

治天行熱祕腸內結

用胡麻油熱服一合取利為度熟油損聲令體重生

油殺蠱摩惡瘡

治大便秘結積熱不通

名獨棗湯

用黑腰棗三枚劈開去核以水銀粉於棗核中塞滿

濕紙裹煨用生葱茶清嚼下一方以棗汁送下又方

用麻線縛定水一盞煮棗熟細嚼熱湯下一方九

梧桐子大薑湯服五九一方麵裹煨熟為末煎湯

調服亦效

附子散 治大便冷秘

用附子一枚炮製去皮臍削去外面留中心如棗大  
碾為末蜜水調下一錢

土瓜根用內方 治大便不通亦治小便

用土瓜根搗汁少許水解之竹筒傾內下部即通

玄明粉散 治大便不通

用玄明粉五錢每服二錢將冷茶磨木香入藥溫服

即通

郁李仁粥方 治大便不通

用郁李仁一兩去皮細研分兩服煮薄粥一碗臨熟時下郁李仁煮二兩沸傾出空心服即通未通再服以通利為度

羚羊角飲 治健忘多驚大便難口中生瘡

羚羊角

鎊一兩

人參

一兩

胡黃連

五錢

赤茯苓

去黑皮

羌

活附子

炮去蘆

梔子仁

炒

牡丹皮

黃芩

去黑皮

麥

門冬

去心炒

薔薇根皮

大黃

炒各一兩

防已

二兩

甘

草

炙三分

右咬咀每服五錢水二盞生薑半塊拍破鹽豉四十粒煎一盞去滓更入淡竹瀝少許攪勻食前溫服

秦朮湯

治大腸虛痼祕澀

秦朮

去苗一兩五錢

防風

去蘆一兩一錢

枳殼

去穢麤炒一兩

桂

去粗皮三

分檳榔

炮剉一兩一錢

牽牛子

生搗一錢

獨活

去蘆頭一兩

朴硝

細研一兩五錢湯成旋下

右吹咀每服三錢水一盞煎至七分去滓加朴硝末半錢更煎兩沸食前溫服日三

檳榔丸

出聖濟總錄

治腸胃受熱氣不宣通瘕聚沈虛

腹脇脹滿大便秘澀

檳榔

剉

大黃

剉炒各二兩

枳殼

去穰麤炒二兩

大麻仁

研

桃

仁

去皮尖雙仁麤炒研

青橘皮

湯浸去白焙

木香

各一兩

右除桃仁麻子仁外為末同研勻煉蜜丸梧桐子大

每服二十九溫水送下日二服以知為度一方無青

橘皮

大黃飲

出聖濟  
總錄

治小腸移熱於大腸腹脇脹滿瘕聚

祕澀

大黃

剉絹裹淨  
度焙乾炒三

澤瀉

黃芩

去黑皮  
心剉

甘草

炙剉  
各一

兩

右咬咀每服三錢水一盞半煎八分去滓空心溫

服晚再服

三黃湯

出聖濟總錄

治虛癰大便祕澀

大黃

剉炒一兩五錢

芒硝

研

黃芩

去黑心各一兩

梔子仁

七枚

甘草

炙剉五錢

右除芒硝外吹咀每服三錢水一盞煎七分去滓入

芒硝五分煎三沸溫服食後臨卧

檳榔九

出聖濟總錄

治大腸受熱癰聚沈虛祕澀不通

檳榔

炮剉一兩

大黃

剉炒二兩

木香

五錢

陳橘皮

湯浸去白焙一兩

牽

牛子

二兩內一兩生為末一兩炒熟另為末



右將四味成末入牽牛子末和為丸煉蜜於臼內塗

酥杵九梧桐子大每服三十九空心溫酒下

潤腸丸

出醫方  
集成

治發汗利小便亡津液大腸秘老人

虛人皆可食

肉蓯蓉

酒浸焙  
二兩

沈香

別研  
一兩

右為末用麻子仁汁打糊為丸梧桐子大每服七

九空心用米飲下

潤腸丸

出東垣  
試效方

治脾胃中伏火大便秘澀或乾燥秘

塞不通全不思食及風結祕血結祕皆令閉塞也以  
潤燥和血疎風自然通

麻子仁一兩 桃仁去皮尖

一兩

羌活

五錢

大黃

煨五錢

當歸

尾

右除麻仁桃仁另研如泥外搗羅為末五上火煉蜜  
丸如梧桐子大每服三十五丸空心白湯下○如病  
人不大便為大便不通而滋其邪盛者急加酒製大  
黃以利之○如血燥而大便不行者加桃仁酒製大  
黃○如風結燥大便不行加麻子仁大黃○如風結

澀而大便不行者加皂角仁大黃秦艽以利之○如  
脈澀覺身有氣澀而大便不通者加郁李仁大黃  
以除之○如寒陰之病為結閉而大便不通者以局  
方中半硫丸或加煎附子乾薑湯冷與之其病雖陰  
寒之證當常服陽藥補之若大便不通者亦當服  
之與一服藥微通其大便不令閉結乃治大法○若  
病人雖是祕結或是陰寒之證其病煩燥脈實堅亦  
與陽藥中少加苦寒之藥以去熱燥燥止勿加○如陰

燥欲坐井中者其二腎脈必按之虛或沈細而遲此  
易為辨耳如有客邪之病亦從權加藥以去之

活血潤燥丸

出東垣  
試效方

治大便風秘不通常燥結

當歸

一錢

防風

三錢

羌活

一兩

大黃

一兩  
紙裹煨

桃仁

二兩  
湯泡去皮

火麻仁

三兩五錢二  
味另研入藥

皂角仁

煨灰存性去皮一兩  
五錢其性得濕則滑

得滑則燥結自  
除用之勿悞

右除麻仁桃仁另研外為末同拌勻煉蜜去沫為丸  
如梧桐子大每服五十九三兩服後日久不能結燥

也以磁器內盛紙封之無令見風

升陽瀉濕湯

出東垣  
試效方

治膈咽不通逆氣不通裏急大

便不行

青皮

分二

甘草

分四

槐子

分二

黃耆

錢一

黃蘗

分三

升麻

分七

生地

分三

熟地黃

分三

當歸

分四

桃仁

錢二

蒼朮

分五

右咬咀如麻豆大作一服另研桃仁如泥一處同

煎水二盞煎一盞去滓稍熱食前服

麻黃白朮散

出東垣  
試效方

治大便不通三日一遍小便

黃赤渾腫面上及腹猶甚其色黃麻木身重如山沈困無力四肢痿軟不動舉動喘促吐清水吐噦痰唾白沫如膠時燥熱發欲去衣須臾而過振寒項額冷如冰額寒猶甚頭旋眼黑目中溜火冷淚鼻不聞香臭小腹急痛當臍有動氣按之堅硬而痛

麻黃

不去節  
五錢

桂枝

三分

杏仁

四枚

吳茱萸

草豆蔻

各五

分厚朴

三分

炒麴

五分

升麻

二分

柴胡

三分

白朮

三分

蒼朮

二分

生甘草

一錢

澤瀉

四分

茯苓

四分

橘紅

二分

青皮

一分

黃連

一分

酒  
製黃耆

分三

人參

分三

甘草

分一

猪苓

分三

黃皮

分一

右咬咀分作二服水二盞半先煎麻黃令沸去沫再入諸藥同煎至一盞去滓稍執食遠服○此證宿有風濕熱伏於榮血之中其木火乘於陽道為至盛元氣短少喘為陽火傷於四肢痿在腎水之間乃所勝之病今正遇冬寒得時乘其肝木又實其母肺金尅火凌木是火大勝必大復其證蓋恐欠多嚏鼻中如有物不聞香臭目視眈眈多悲健忘小腹急痛通身

黃腹大脹面目腫猶甚食不下痰唾涕有血目皆瘍  
大便不通只二服皆已

驅風丸

出朱氏  
集驗方

治大便不通或年高風秘

皂角

七挺炮按  
水兩碗

巴豆

四十九粒  
去殼心膜

枳殼

一兩

右以皂角按水煮乾為末去巴豆不用炒枳殼為末  
入木香五錢蜜丸如梧桐子大空心白湯下三十丸

順氣丸

出宜  
如方

治大腸每祕澀即諸風病發或諸關發

大黃

五兩半  
生半熟

車前子

檳榔

麻仁

炒

牛膝

酒浸

郁



李仁

湯浸  
去皮

兔絲子

酒浸  
蒸

山藥

各二  
兩

山茱萸

防

風

右為末蜜丸梧桐子大茶湯米湯任下此藥補益  
通利疎風順氣治丈夫婦人膈上虛弱燥熱肺腑  
痰壅調三焦開胃口大小便秘結不通及腸風等疾

神功丸

出普濟  
本事方

人參

五錢

阿梨勒

生用  
一兩

大黃

蒸一  
兩

麻仁

八錢

右為末除出麻仁研為膏次入前藥煉蜜丸如梧桐

子大每服二十九空心茶酒任下

枳殼丸

出濟生方

治腸胃風氣壅盛大便秘澀

皂角

一挺去黑皮炒

枳殼

製炒

大黃

炒

羌活

木香

淨陳

皮 白芷 桑白皮

右為末蜜丸梧桐子大每服七十九空心米飲或薑

湯下

三和散

方見三焦類門三焦類

治七情氣結五臟不通脾胃不和

大便秘澀

金液湯

出如宜方

治臟寒大腸挾冷結滯

硫黃

淨揀去沙石十兩研細飛過用磁盆盛水和赤石脂以鹽泥封固候乾地內先埋一小罐

盛水令滿置盒在上再以泥封固以慢火養七日七夜候足頂上加火一片煅之候冷取出研為末

右藥末一兩用蒸一兩湯浸去藥水和為丸如梧桐

子大每服三十丸多至百丸溫米飲下空心服又宜

麻仁杏仁煎湯下如大腸乾燥宜蜜導法

方見櫻核大小

便淋澀門大

便不通類

正真丹

余居士選奇方

治老人氣虛滿悶大便秘澀連日不

通不敢服藥下者宜服此

硫黃

一兩研

陳皮

五錢去白

五靈脂

一分

右先搗陳皮次搗五靈脂硫黃同搗勻麵丸如梧桐子大每服五十九食前米飲下

和血通經湯

出東垣蘭室方

靈壽縣長董監軍癸卯冬大雪

時因公到真定忽有大風氣暴至

闕

親張耘夫求醫

診候得六脈俱弦甚急按之洪實有力其證手足攣急難明其狀大便秘澀面赤而熱此風始至於身也四

肢者脾也以風寒傷之則搐極而攣閉乃風淫未深而寒在外也內經曰寒則筋攣正謂此也本人素飲酒內有實熱乘於腸胃之間故大便秘澀而面赤熱內則乃手足陽明受邪外則足大陰脾之經受寒之邪乃以桂枝甘草根以却其寒邪而按其急搐又以黃栢之苦寒滑以瀉實而潤燥急救腎水使以升麻葛根以升陽氣行手足陽明之經不令遏絕更以桂枝辛熱入手陽明之經為引用潤燥復以芍藥甘草

專補脾氣使人不受風寒之邪而退木邪專益肺也  
加人參以補元氣為之補佐加當歸身去裏急而和  
血

升麻

錢一

葛根

錢一

當歸身

錢一

人參

錢一

桂枝

錢二

芍藥

錢五分

甘草根

錢一

黃栢

酒製

二錢

右剉麻豆大煎法如常令煖房中近火摩其手一  
服乃愈

化積滯通大腸方

楊子建  
護命方

芫花

一兩

牽牛

一兩

鱉甲

醋炙五錢

狼毒

製如前

獨活

大黃

薄切醋煮乾

羌活

牡丹皮

去心

桔梗

當歸

牛膝

荊芥穗

各一兩

半夏

三錢

右件依法修製芫花狼毒二味木臼中杵羅為末  
所餘諸藥合一處杵羅為末後總合一處相滾令  
芫花狼毒與衆藥末拌勻每服二錢匕土器內煎  
葱湯調下

大橘皮丸

出十便良方

治大便秘

厚朴

一兩

橘皮

一兩

杏仁

一兩三錢

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五七十九非

時米飲下

神效丸

出衛生家寶方

治大便秘

黃梔子

隔年者

大黃

炮

甘草

各等分

右碾羅細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九

畧秘者用白湯下秘甚者以煎橘皮湯下之食前

服



五仁丸

出澹寮方

治大便秘澀可以常服

杏仁

酒浸去皮尖麵炒令黃取淨一兩細研

郁李仁

湯浸去皮尖取淨一兩細研

栢子仁

揀淨一兩細研

酸棗仁

湯浸去皮取淨一兩細研

大麻子仁

曬令

乾用板子盛住上以磚一片壓定輕輕以手摩磚則皮自脫取未脫者再摩之揀淨一兩細研

右五味再合研令極細以水浸蒸餅為丸梧桐子大每服五十九丸空心米飲吞下

通秘散

出十便良方

治風秘大便澀

香白芷

不拘多少炒乾

右為細末每服二錢蜜少許溫米飲調下連進二服食前

香木丸

出余居士選奇方

治腹脹痛臍秘

蒼朮

一兩

厚朴

薑汁炙一兩

陳皮

一兩

生好硫黃

二兩用蘿蔔煎沸湯

洗三次

右搗羅為末浸蒸餅糊為丸如梧桐子大每服三五丸日二服米湯下

麻仁丸

出直指方

調三焦潤五臟治大便不通年高老

人宜服

白檳榔

半煨  
半生

車前子

羌活

去蘆

木香

各一兩

肉桂

去粗

皮

山茱萸

兔絲子

酒浸一宿  
另研為末

枳殼

去穰  
麩炒

防風

去蘆

頭及  
又

山藟

各一兩  
五錢

麻仁

另搗  
研

大黃

半蒸  
半生

郁李仁

皮

另搗碎  
各四兩

右為細末共研和勻煉蜜丸梧桐子大每服十五丸  
至二十九溫水吞下臨卧服

通腸丸

出十便  
良方

治大腸結不通

厚朴

製為木

猪胰

各等分

右用猪胰研和如梧桐子大每服三十九生薑湯下

四順飲子

出十便良方

治大便不通面目身熱口舌生瘡

上焦胃悶時欲得冷此三陽氣壅致大腸熱結脉氣

洪大

大黃

赤芍藥

甘草

當歸

各等分

右為粗末每服五錢水一盞半煎一盞溫服

潤腸丸

出衛生寶鑑方

治胃膈痞悶大便澀滯

麻子仁

二兩五錢  
研極細

桃仁

五錢  
當歸尾

生甘草

三錢

枳實

五錢  
麩炒

大黃

酒煨一兩五錢

白芍藥

五錢

木香

二錢

陳皮

三錢升麻

五錢

檳榔

二錢人參

三錢

右件除麻仁桃仁外搗為末却入麻仁桃仁泥子和勻蜜九如梧桐子大每服七八十九溫水食前服

治大便不通

出本草

研麻子相和為粥食

治大便不通十日至一月

出本草

用冬葵子三升水四升煮取一升去滓服不差再服

又方

出危氏方

用枳實阜角等分為末飯糊為丸米飲下

枳實湯

出濟生方

治腹脹發熱大便秘澀脈多洪數此名

熱脹

枳實

去穢麤炒五錢

厚朴

薑製炒一兩

大黃

酒蒸三錢

甘草

炙三錢

桂心

不見火二錢五分

右呔咀每服四錢水一盞半生薑五片棗二枚煎至七分去滓溫服不拘時候嘔者加半夏一錢

小黃耆丸

出十便良方

治大腸風熱大便秘澀及五痔結

核

防風

一兩

黃耆

二兩

川芎

五錢

皁子仁

一錢

枳殼

一錢

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九不拘時候米飲下

麻仁丸

出楊氏家藏方

治大便秘澀

麻仁

一兩  
另研

杏仁

去皮尖  
麵炒二錢

枳實

去穢  
炒五錢

白芍藥

五錢  
黑牽牛

一兩  
七錢

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服五十九溫熱

水送下食前

麻子仁丸

出三  
因方

治太陽脉浮而澀浮則胃氣強澀則

便數浮澀相搏大便則堅其脾為約大便堅小便利而不渴

麻子仁

五兩  
炒

芍藥

八兩

枳實

麩炒  
八兩

大黃

蒸一  
斤

厚朴



薑汁炒  
杏仁  
五錢  
去皮尖炒另  
研五兩五錢

右為末煉蜜九梧桐子大每服二十九溫水下未知  
加至五十九一方麻仁一兩五錢杏仁三錢大黃  
一兩枳實芍藥厚朴各五錢此依局方上本是漢  
方合用大黃枳殼一斤正得合一兩厚朴當用四  
兩杏仁用六錢一方麻仁一兩二錢五分芍藥一  
兩乃均製合理用當以理推

治大腸氣祕壅熱結澀

出本草

牽牛子

微炒搗取其粉一兩

桃仁


麤炒去皮尖取末五錢

右以熱蜜和丸如梧桐子大溫水服三二十九不可久服亦行脾腎氣故也

導引法

養生方云偃卧直兩手捻左右脇除大便難腹痛腹中寒口內氣鼻出氣溫氣咽之數十病愈

普濟方卷三十九



[illegible]